

Medikamentöse Therapie der Oesophagusvarizen- und schweren oberen Gastrointestinalen Blutung

gleichwertig sind alternativ:

- Glycylpressin (=Terlipressin®) initial 2mg i.v., danach 1mg i.v. alle 4 Stunden + Nitropflaster 10mg/24h*
- Somatostatin 250µg Bolus, danach via Perfusor 250µg/h
- Octreotid (=Sandostatin®) 25µg/h i.v.**

Therapiedauer jeweils 3 Tage

*off label für obere GI-Blutung, **off label für Oesophagusvarizenblutung und obere GI-Blutung

Literatur:

Cho SB, Park KJ, Lee JS, Lee WS, Park CH, Joo YE, Kim HS, Choi SK, Rew JS, Kim SJ
Comparison of terlipressin and octreotide with variceal ligation for controlling acute esophageal variceal bleeding--a randomized prospective study.
Korean J Hepatol. 2006 Sep;12(3):385-93.

Abid S, Jafri W, Hamid S, Salih M, Azam Z, Mumtaz K, Shah HA, Abbas Z.
Terlipressin vs. octreotide in bleeding esophageal varices as an adjuvant therapy with endoscopic band ligation: a randomized double-blind placebo-controlled trial.
Am J Gastroenterol. 2009 Mar;104(3):617-23. Epub 2009 Feb 17.

May A, Ell C.
Gastroenterological endoscopy
Dtsch Med Wochenschr. 2011 Feb;136(5):206-8. Epub 2011 Jan 26

sowie www.dgvs.de